

# Minder mezen?

Waar zijn de mezen? Dat vroegen deelnemers aan de Jaarrond Tuin-telling zich af vanaf september 2016. Ze telden in hun tuin beduidend minder Kool- en Pimpelmezen dan in het voorgaande jaar. Uit tuintellingen in Duitsland en Engeland kwamen soortgelijke signalen. De Nationale Tuinvogeltelling in januari bevestigde dit beeld. Minder mezen in de tuinen dus.

Al snel werd gedacht aan het effect van een erg slecht broedseizoen. Uit de gegevens van duizenden nestkaarten bleek dat Koolmezen in het voorjaar van 2016 relatief laat begonnen met broeden en kleine legfels hadden. Ze brachten historisch weinig jongen groot, wat ook bleek uit ringvangsten (CES-project). De Pimpelmees kende vergelijkbare resultaten. er saldo waren er daardoor flink wat minder mezen dan in succesvolle jaren. Toch was dat niet het hele verhaal. In de beukenbossen voltrok zich in 2016 een zogenaamd volmastjaar: vanaf november lagen er overal beukennootjes waaraan de mezen zich te buiten konden gaan, terwijl vetbollen in tuinen onaangeroerd bleven. PTT-tellers, die vooral in het buitengebied actief zijn, zagen dan ook gewone aantallen: gemiddeld 10 Pimpelmezen en 16 Koolmezen per getelde route. Ook vond er in het najaar maar bar weinig doortrek van mezen plaats ([trektellen.nl](http://trektellen.nl)). Van aankomst uit oostelijker gebieden was vrijwel geen sprake. De mezen bleven waar ze zaten en dat was vooral niet in tuinen.

*Koolmees op sparrenkegel.  
Foto: Menno van Duijn/AGAMI*

